

TABL. 8 (154). ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS

CHOROBY	2000	2003	2004	2000	2003	2004	DISEASES
	w liczbach bezwzględnych <i>in absolute numbers</i>	na 100 tys. ludności <i>per 100 thous. population</i>					
Krztusiec	9	59	160	0,4	2,7	7,3	<i>Whooping cough</i>
Odra	7	1	1	0,3	0,0	0,0	<i>Measles</i>
Wirusowe zapalenie wątroby	236	173	178	10,9	7,9	8,1	<i>Viral hepatitis</i>
w tym typ B	107 ^a	91 ^a	57	4,9 ^a	4,2 ^a	2,6	<i>of which type B</i>
Różyczka	870	245	226	40,1	11,2	10,3	<i>Rubella</i>
AIDS ^b	16 ^a	15 ^a	11	0,7 ^a	0,7 ^a	0,5	<i>AIDS^b</i>
Salmonellozy	1433	1294	1184	66,1	59,2	54,0	<i>Salmonella infections</i>
Czerwonka bakteryjna	8	3	15	0,4	0,1	0,7	<i>Shigellosis</i>
Inne bakteryjne zatrucia po-karmowe	440	336	417	20,3	15,4	19,0	<i>Other bacterial food borne intoxications</i>
Biegunki u dzieci do lat 2 ^c ...	1774 ^a	1408 ^a	1493	373,0 ^a	312,4 ^a	331,9	<i>Diarrhoea and gastroenteritis of presumed of infections origin (under 2 years)^c</i>
Szkarlatyna (plonica)	355	398	549	16,4	18,2	25,0	<i>Scarlet fever</i>
Zapalenie opon mózgowych	157	130	124	7,2	5,9	5,7	<i>Meningitis</i>
Zapalenie mózgu	28	21	37	1,3	1,0	1,7	<i>Encephalitis</i>
Świnka (zapalenie przyusz-nicy nagminne)	1458	8875	8831	67,2	406,0	402,8	<i>Mumps</i>
Toksoplazmoza	10	7	10	0,5	0,3	0,5	<i>Toxoplasmosis</i>
Tasiemczyce	54	22	18	2,5	1,0	0,8	<i>Cestode infestations</i>
Włośnica	-	-	21	-	-	1,0	<i>Trichinellosis</i>
Świerzb	726	322	300	33,5	14,7	13,7	<i>Scabies</i>
Grypa	174517	58799	10358	8047,5	2689,8	472,4	<i>Influenza</i>
Szczepienia przeciw wściekliźnie	582	433	442	26,8	19,8	20,2	<i>Rabies vaccinations</i>

^a Dane zmienione w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika. ^b Dane niedostateczne z uwagi na specyfikę choroby. ^c Wskaźnik obliczono na 10 tys. dzieci w wieku do lat 2.

Źródło: dane Państwowego Zakładu Higieny.

a Data have been changed in relation to data published in the previous edition of the Yearbook. b Preliminary data because of specific features of the disease. c Ratio calculated per 10 thous. children up to the age of 2.

SOURCE: data of the National Institute of Hygiene.

