

TABL. 9 (171). ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS

CHOROBY	2000	2005	2006	2000	2005	2006	DISEASES
	w liczbach bezwzględnych <i>in absolute numbers</i>			na 100 tys. ludności <i>per 100 thous. population</i>			
Krzusiec	9	99	14	0,4	4,5	0,6	Whooping cough
Odra	7	1	7	0,3	0,1	0,3	Measles
Wirusowe zapalenie wątroby	236	439	241	10,9	20,0	10,9	Viral hepatitis
typ A	5	3	3	0,2	0,1	0,1	type A
typ B	107	131	79	4,9	6,0	3,6	type B
typ C	118	305	159	5,4	13,9	7,2	type C
Różyczka	870	324	1895	40,1	14,7	86,1	Rubella
AIDS ^a	16	10	13	0,7	0,5	0,6	AIDS ^a
Salmonellozy	1433	1190	1152	66,1	54,2	52,3	Salmonella infections
Czerwonka bakteryjna	8	7	2	0,4	0,3	0,1	Shigellosis
Inne bakteryjne zatrucia po- karmowe	440	679	417	20,3	30,9	18,9	Other bacterial foodborne intoxications
Biegunki u dzieci do lat 2 ^b ...	1774	1429	1803	373,0	311,7	384,1	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed of infections origin (under 2 years) ^b
Szkarlatyna (płonica)	355	715	433	16,4	32,5	19,7	Scarlet fever
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	65	79	64	3,0	3,6	2,9	Bacterial meningitis and encephalitis
Wirusowe zapalenie opon mózgowych	93	65	133	4,3	3,0	6,0	Viral meningitis
Wirusowe zapalenie mózgu	17	25	12	0,8	1,1	0,6	Viral encephalitis
Świnka (zapalenie przyusz- nicy nagminne)	1458	1171	231	67,2	53,3	10,5	Mumps
Toksoplazmoza	10	10	46	0,5	0,5	2,1	Toxoplasmosis
Tasiemczyce	54	13	24	2,5	0,6	1,1	Cestode infestations
Włośnica	-	-	9	-	-	0,4	Trichinellosis
Świerzb	726	342	633	33,5	15,6	28,8	Scabies
Grypa i podejrzenia zacho- rowań na grypę	174517	44049	3641	8047,5	2005,0	165,4	Influenza and influenza-like illness
Choroby weneryczne	97	48	77	4,5	2,2	3,5	Veneral diseases
Gruźlica	630	568	518	29,1	25,9	23,5	Tuberculosis
Szczepieni przeciw wściekliznie	582	479	511	26,8	21,8	23,2	Rabies vaccinations

^a Dane nieostateczne z uwagi na specyfikę choroby. ^b Wskaźnik obliczony na 10 tys. dzieci w wieku do lat 2.

Źródło: dane Państwowego Zakładu Higieny.

^a Preliminary data because of specific features of the disease. ^b Ratio calculated per 10 thous. children up to the age of 2.

Source: data of the National Institute of Hygiene.